

说明单

淋病通常不会出现症状。它是非常容易治愈，如果不及时治疗可导致严重的并发症。使用避孕套是最佳的预防方法。

淋病 (Gonorrhoea)

最后更新日期 2011 年 3 月 25 日

什么是淋病 (What is gonorrhoea)?

淋病是一种通过性行为传播的细菌感染，可以感染咽喉、肛门、尿道（尿液通道）、宫颈（子宫的颈部）和眼睛。淋病有时亦称为 'gono' 或 'the clap'。

是否有任何的症状 (Are there any symptoms)?

除了尿道以外，通常不会出现症状。患有淋病的人往往在不知情的情况下传染其他人。如果出现症状，通常都会在感染后的 2-10 天内出现，男性与女性之间所受的影响会有所不同：

对于**男性**，可能包括以下症状：

- 阴茎出现分泌物
- 小便时感觉不适或疼痛
- 阴茎口周围发红
- 肛门出现分泌物或感不适
- 结膜炎和眼睛发炎

对于**女性**，可能包括以下症状：

- 阴道出现异常的分泌物
- 阴道不规则出血
- 小便时感觉疼痛
- 盆腔疼痛，尤其是在性交时
- 肛门出现分泌物或感不适
- 结膜炎和眼睛发炎

如果妇女不及早接受治疗，淋病会撒播到子宫和输卵管而引起盆腔炎(PID)，这是一种会导致不育的病。

如何传染(How is it transmitted)?

淋病是通过肛门、阴道或口部的性交而传染。

即使没有明显的症状，淋病还是会传染的。

如何预防 (How is it prevented)?

使用安全套和水性润滑剂能够显著降低淋病传染以及其他性传染病的风险。

即使使用避孕套，也不要和被诊断出患有淋病的人性交，直至完成治疗为止。

定期接受性传染病的检查在出现并发症前避免传染其他人，。应必须使用安全套。

如何诊断 (How is it diagnosed)?

淋病可以通过你的医生进行诊断。淋病可以通过拭子（使用长棉签）在可能受感染的任何部位 – 宫颈、尿道、肛门或咽喉 – 采样到实验室化验。可能会使用尿检检查尿道有否被感染。这些检查是无痛的。

如何治疗 (How is it treated)?

淋病可以简单地通过单剂抗生素治愈。

告知伴侣 (Telling partners)

如果你受到淋病感染，必须告知你的性伴侣，让他/他们能够接受检验和治疗。你的医生能够协助你决定谁可能面临风险并且协助你联络他/他们。

淋病是一种须呈报疾病。意思是指如果有新的案例，医生和实验室职员都必须依法通知新州卫生局。这资料是保密的，只作公共卫生规划之用。

这份说明单的资料内容广泛，如果你对自己的健康存有疑虑，就应该去看医生。

联络 (Contact)

新州性健康资讯热线(NSW Sexual Health Infoline) 免费电话 **1800 451 624**。