

เอกสารข้อมูล

โรคหนองในมักจะไม่ค่อยแสดงอาการ เป็นโรคที่รักษาง่าย แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่รักษา อาจก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนอย่างร้ายแรง ฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด

โรคหนองใน (Gonorrhoea)

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 25 มีนาคม 2011

โรคหนองในคืออะไร? (What is gonorrhoea?)

โรคหนองในคือโรคติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อที่ลำคอ ทวารหนัก ท่อปัสสาวะ (ยูรีทรา) คอหลอดลม (เซอรัลิกซ์) และตา โรคหนองในนี้บางทีก็เรียกกันว่า 'โกโน' หรือ 'เดอะ แคล็พ'

มีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดไหม? (Are there any symptoms?)

ตามปกติไม่มีอาการ ยกเว้นที่ท่อปัสสาวะ มีบ่อยครั้งที่ผู้ที่เป็นโรคหนองในแพร่เชื้อโรคนี้ออกไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ถ้ามีอาการเกิดขึ้นมักเกิดขึ้นในระยะ 2 ถึง 10 วันหลังการติดเชื้อ และมีผลต่อผู้ชายและสตรีแตกต่างกัน

สำหรับบุรุษอาการที่เกิดขึ้นอาจรวมถึง:

- มีของเหลวออกจากองคชาต
- คันหรือเจ็บเวลาปัสสาวะ
- รอบปลายขององคชาตเป็นสีแดง
- เจ็บทวารหนัก หรือมีของเหลวออก
- เยื่อตาขาวและตาอักเสบ

สำหรับสตรีอาการที่เกิดขึ้นอาจรวมถึง:

- มีตกขาวออกจากอวัยวะเพศอย่างผิดปกติ
- มีเลือดออกทางอวัยวะเพศบางครั้งบางคราว
- เจ็บเวลาปัสสาวะ
- เจ็บเชิงกราน โดยเฉพาะขณะมีเพศสัมพันธ์
- เจ็บทวารหนัก หรือมีของเหลวออก
- เยื่อตาขาวและตาอักเสบ

ถ้าสตรีเป็นโรคหนองในและไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจแพร่เข้าไปในมดลูกและท่อรังไข่ ก่อให้เกิดโรคเชิงกรานอักเสบ (PID) ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นหมันได้

แพร่เชื้อได้อย่างไร? (How is it transmitted?)

โรคหนองในแพร่เชื้อถึงกันได้ผ่านทางกรรมมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ทางอวัยวะเพศ หรือ ทางปาก

โรคหนองในแพร่เชื้อถึงกันได้แม้ว่าจะไม่มีอาการ

ป้องกันได้อย่างไร? (How is it prevented?)

ใช้ถุงยางอนามัยและครีมหล่อลื่นที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบจะลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคหนองใน และการติดเชื้อที่ผ่านทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อย่างไม่ผลดี

อย่าร่วมเพศกับใครที่เคยได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นโรคหนองใน แม้ว่าจะใช้ถุงยางอนามัยก็ตาม จนกว่าการบำบัดรักษาจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นเวลา 7 วัน

ไปรับการตรวจการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ (STI) อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ ก่อนที่โรคแทรกซ้อนต่างๆ จะเกิดขึ้น และเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น ใช้ถุงยางอนามัยเสมอ

วินิจฉัยโรคนี้ได้อย่างไร? (How is it diagnosed?)

แพทย์ของท่านสามารถวินิจฉัยโรคหนองในได้ โดยการปาดเชื้อ (ใช้สำลีพันปลายไม้ยาว) จากบริเวณใดก็ได้ที่อาจติดเชื้อ เช่นที่ ปากมดลูก ท่อปัสสาวะ ทวารหนัก หรือ ลำคอ – และนำไปทำการทดสอบในห้องทดลอง อนึ่ง อาจมีการนำตัวอย่างปัสสาวะมาใช้เพื่อตรวจหาการติดเชื้อในท่อปัสสาวะ การตรวจสอบเหล่านี้ไม่เจ็บปวดแต่อย่างใด

รักษาได้อย่างไร? (How is it treated?)

โรคหนองในนี้รักษาให้หายได้ง่ายมากโดยการกินยาปฏิชีวนะเพียงขนานเดียว

บอกให้คู่นอนทราบ (Telling partners)

ถ้าท่านเป็นโรคหนองใน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องบอกให้คู่นอนของท่านทราบ เพื่อว่าเขาจะไปรับการตรวจและรักษา แพทย์ของท่านจะช่วยท่านตัดสินใจได้ว่าใครบ้างที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยงต่ออันตราย และช่วยท่านในการติดต่อกับคนเหล่านั้น

โรคหนองในเป็นโรคที่ต้องแจ้งให้ทางการทราบ

ซึ่งหมายความว่าแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องทดลองมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องแจ้งให้กระทรวงการสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูลนี้จะถูกสงวนเป็นความลับ และใช้ในการวางแผนสาธารณสุข

ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ท่านควรปรึกษาแพทย์หากท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของท่าน

ติดต่อ (Contact)

บริการสายข้อมูลสุขภาพทางเพศของรัฐนิวเซาท์เวลส์ โทรศัพท์ฟรีหมายเลข **1800 451 624**