說明單張

淋病通常不會出現症狀。它是非常容易治愈，如果不及時治療可導致嚴重的並發症。使用避孕套是最佳的預防方法。

淋病 (Gonorrhoea)

最後更新日期 2011 年 3 月 25 日

什麼是淋病 (What is gonorrhoea)?

淋病是一種通過性行為傳播的細菌感染，可以感染咽喉、肛門、尿道（尿液通道）、宮頸（子宮的頸部）和眼睛。淋病的英語有時亦稱為 'gono' 或 'the clap'。

是否有任何的症狀 (Are there any symptoms)?

除了尿道以外，通常不會出現症狀。患有淋病的人往往在不知情的情況下傳染其他人。如果出現症狀，通常都會在感染後的 2-10 天內出現，男性與女性之間所受的影響會有所不同：

對於**男性**，可能包括以下症狀：

- 陰莖出現分泌物
- 小便時感覺不適或疼痛
- 陰莖開口周圍發紅
- 肛門出現分泌物或感不適
- 結膜炎和眼睛發炎

對於**女性**，可能包括以下症狀：

- 陰道出現異常的分泌物
- 陰道不規則出血
- 小便時感覺疼痛
- 盆腔疼痛，尤其是在性交時
- 肛門出現分泌物或感不適
- 結膜炎和眼睛發炎

如果婦女不及早接受治療，淋病會撒播到子宮和輸卵管而引起盆腔炎(PID)，這是一種會導致不育的病。

如何傳染(How is it transmitted)?

淋病是通過肛門、陰道或口部的性交而傳染。

即使沒有明顯的症狀，淋病還是會傳染的。

如何預防 (How is it prevented)?

使用安全套和水性潤滑劑能夠顯著降低淋病傳染以及其他性傳染病的風險。

即使使用避孕套，也不要和被診斷出患有淋病的人性交，直至完成治療為止。

在出現並發症前和避免傳染其他人，定期接受性傳染病的檢查。必須使用安全套。

如何診斷 (How is it diagnosed)?

淋病可以通過你的醫生進行診斷。淋病可以通過拭子（使用長棉籤）在可能受感染的任何部位– 宮頸、尿道、肛門或咽喉– 採樣到實驗室化驗。可能會使用尿檢檢查尿道有否被感染。這些檢查是無痛的。

如何治療 (How is it treated)?

淋病可以簡單地通過單劑抗生素治愈。

告知伴侶 (Telling partners)s

如果你受到淋病感染，必須告知你的性伴侶，讓他/他們能夠接受檢驗和治療。你的醫生能夠協助你決定誰可能面臨風險並且協助你聯絡他/他們。

淋病是一種須呈報疾病。意思是指如果有新的案例，醫生和實驗室職員都必須依法通知新州衛生局。這資料是保密的，只作公共衛生規劃之用。

這說明單張的資訊內容廣泛，如果你對自己的健康存有疑慮，就應該去看醫生。

聯絡 (Contact)

新州性健康資訊熱線 (NSW Sexual Health Infoline) 免費電話 **1800 451 624**。