

غالباً ليس لداء السيلان أية أعراض ومن السهل علاجه، ولكنه إذا بقي دون علاج فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. العازل المطاطي هو أفضل وقاية.

داء السيلان (Gonorrhoea)

تم تحديثها في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١١

ما هو داء السيلان؟ (What is gonorrhoea?)

داء السيلان التهاب ينتقل عبر الجنس وسببه بكتيريا قد تصيب الحنجرة والشرج ومجرى البول وعنق الرحم والعيون. يسمى داء السيلان أحياناً "gono" أو "the clap".

هل هناك أية أعراض؟ (Are there any symptoms?)

عادةً ليست هناك أية أعراض إلا في مجرى البول. يصاب الأشخاص غالباً بداء السيلان وينقلونه إلى الآخرين دون أن يدروا. وإذا ظهرت أية أعراض فهي عادة تبدأ بالظهور بعد مضي يومين إلى ١٠ أيام على الإصابة، وهو يؤثر على الرجال والنساء بطرق مختلفة:

عند الرجال، يمكن أن تشمل الأعراض:

- إفرازات من القضيب
- انزعاج أو ألم عند التبول
- احمرار حول فتحة القضيب
- إفرازات من الشرج أو انزعاج
- التهاب الملتحمة أو التهاب العين

عند النساء، يمكن أن تشمل الأعراض:

- إفرازات غير عادية من المهبل
- نزيف مهبلي متقطع
- ألم عند التبول
- ألم في الحوض، خاصة أثناء ممارسة الجنس
- إفرازات من الشرج أو انزعاج
- التهاب الملتحمة أو التهاب العين

إذا لم يتم علاج داء السيلان عند النساء فإنه قد يمتد إلى الرحم وقناتي فالوب مسبباً مرض التهاب الحوض، وهي حالة قد تؤدي إلى العقم.

كيف تنتقل العدوى؟ (How is it transmitted?)

تنتقل عدوى داء السيلان من خلال ممارسة الجنس الشرجي أو المهبلي أو الفموي.

يمكن لعدوى داء السيلان أن تنتقل حتى عند عدم وجود أية أعراض.

كيف يمكن الوقاية منه؟ (How is it prevented?)

استخدام العازل المطاطي ومادة مخففة للاحتكاك مائية المصدر قد يخفف بشكل كبير من خطر انتقال داء السيلان وغير ذلك من الأمراض الجنسية المعدية.

لا تمارس/ي الجنس مع شخص تم تشخيص داء السيلان لديه، حتى مع استخدام العازل المطاطي، إلا بعد إكمال العلاج.

اخضع/ي لفحوصات الأمراض التي تنتقل عبر الجنس بانتظام للكشف عن أية عدوى قبل حصول مضاعفات ولمنع انتقالها للآخرين. يجب استخدام العازل المطاطي دائماً.

كيف يتم تشخيصه؟ (How is it diagnosed?)

يمكن للطبيب أن يشخص داء السيلان. ويتم التشخيص من خلال إجراء مسحة (باستخدام عود طويل قطني الطرف) من أي مكان قد يكون مصاباً – عنق الرحم، مجرى البول، الشرج أو الحنجرة – وفحصه في المختبر. يمكن أيضاً استخدام عينة بول للتحقق من وجود التهابات في مجرى البول. الفحوصات غير مؤلمة.

كيف يتم علاجه؟ (How is it treated?)

يتم علاج داء السيلان بسهولة من خلال جرعة واحدة من المضادات الحيوية.

إخبار الشريك (Telling partners)

إذا كنت مصاباً/ة بداء السيلان من الضروري إخبار شريكك/شريكتك الجنسي/ة لكي يخضع/تخضع للفحص والعلاج. يمكن للطبيب مساعدتك في تحديد الأشخاص الذين قد يكونوا في خطر والاتصال بهم.

داء السيلان مرض يجب التبليغ عنه. ويعني ذلك أن الطبيب وموظفي المختبر ملزمون قانونياً بإخبار دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز حول الحالات الجديدة. هذه المعلومات سرية وخصوصية وتستخدم لمصلحة الصحة العامة.

المعلومات المذكورة في هذه النشرة هي معلومات عامة و عليك مراجعة الطبيب إذا كنت قلقاً بشأن صحتك.

للاتصال (Contact)

الرقم المجاني لخط المعلومات التابع للصحة الجنسية في نيو ساوث ويلز 1800 451 624.