

說明單張

梅毒是一種可以治療並且使用抗生素治癒的性傳染病。如果不及早醫治是會影響到腦部、脊髓和其他器官。安全套可以預防傳染。

梅毒 (Syphilis)

最後更新日期 2011 年 3 月 25 日

什麼是梅毒 (What is syphilis)?

梅毒是一種通過性行為傳播的細菌感染。如果接受不治療，梅毒可以導致嚴重而且不可逆轉的損害。

梅毒在澳大利亞並不常見，但因男性與男性之間性交而感染上梅毒的人數漸漸增加。

是否有任何的症狀 (Are there any symptoms)?

梅毒的症狀很多時候都沒被注意。

梅毒有四個階段：初期、第二期、潛伏期和第三期。每一個階段都有不同的症狀。

1. 初期梅毒 (Primary syphilis) (感染後的十至九十天)

在這個階段，口腔、肛門、陰莖、陰道或宮頸會出現瘡子或潰瘍。因為瘡子是不會感覺疼痛而且可能會隱藏在無法看到的部位（例如直腸內或宮頸上），所以往往不被發現。它會在兩至六星期後消失。

2. 第二期梅毒 (Secondary syphilis) (感染後的七至十星期)

第二期的症狀也有可能不被注意。如果有發現，這些症狀包括：

- 手、背、胸或腳上出現紅疹（這種疹子的傳染性非常高）
- 發燒
- 腹股溝和腋下的腺體腫脹
- 脫髮
- 全身乏力

3. 潛伏期梅毒 (Latent syphilis)

這個階段沒有明顯的症狀，但身體仍然是帶菌的。如果不在這個階段進行治療，梅毒會持續潛伏（休眠狀態）一輩子或會發展成第三期梅毒。

4. 第三期梅毒 (Tertiary syphilis)

患有潛伏期梅毒而沒有接受治療的人當中，有三分之一會發展成第三期梅毒。在這個階段，細菌幾乎會損害身體的任何部位，包括心臟、腦部、脊髓、眼睛和骨頭。這損害可以在初期的幾年、甚至幾十年後發生。第三期梅毒會導致精神病、失明、失聰、神經疾病、心臟病和死亡。

梅毒會導致胎兒患有先天缺陷甚至死亡。

它是如何被傳染的 (How is it transmitted)?

梅毒是通過肛門、口部或陰道性行為時的皮膚接觸而傳染。梅毒在感染初期和第二期的階段出現瘡子或疹子時傳

染性非常高。在更罕見的情況下，梅毒在懷孕期間由母親傳染給自己的胎兒。

如何預防 (How is it prevented)?

在出現並發症前和避免傳染其他人，定期接受性傳染病的檢查。必須使用安全套。

使用安全套和水性潤滑劑能夠顯著降低衣原體傳染以及其他性傳染病的風險。

即使使用避孕套，也不要和被診斷出患有梅毒的人性交，直至完成治療為止。

如何診斷 (How is it diagnosed)?

需要進行血液檢驗診斷感染。如果在感染初期出現瘡子，醫生可以通過拭子（使用長棉籤）採樣化驗。不論有沒有出現瘡子，醫生都能夠通過血液檢驗尋找梅毒抗體。抗體需要大約三至六個月的時間於血液中長成，所以初次檢驗可能會呈陰性。因為初次血液檢驗是要尋找身體製造用來對抗感染的抗體，所以結果呈陽性即表示你目前或以前受到感染。有需要進行其他的檢驗來確定到底感染是否仍然活躍。治療後還有機會再受感染。

孕婦都要接受梅毒檢驗，以預防胎兒受到感染。

如何治療 (How is it treated)?

梅毒可以簡單地通過青黴素注射或藥片治療。治療時間取決於感染的階段。你可能需要接受後續的血液檢驗以確認你的治療是否有效。

告知伴侶 (Telling partners)

如果你有梅毒，在醫生還未告訴你你的治療成功前，都不能進行性交。你必須告知你性伴侶，讓他們能夠接受檢驗和治療。你的醫生能夠協助你決定誰可能面臨風險並且協助你聯絡他們。

梅毒是一種須呈報疾病。意思是指如果有新的案例，醫生和實驗室職員都必須依法通知新州衛生局。這資料是保密的，只作公共衛生規劃之用。

這說明單張的資訊內容廣泛，如果你對自己的健康存有疑慮，就應該去看醫生。

聯絡 (Contact)

新州性健康資訊熱線(NSW Sexual Health Infoline) 免費電話 **1800 451 624**。