

الزهري مرض ينتقل عبر الجنس ويمكن معالجته والشفاء منه بواسطة المضادات الحيوية. وإذا لم تتم معالجته يمكن أن يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي وأعضاء الجسم الأخرى. يمكن للعازل المطاطي منع انتقال العدوى.

## الزهري (Syphilis)

تم تحديثها في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١١

### ما هو مرض الزهري؟ (What is syphilis?)

الزهري مرض ينتقل عبر الجنس تسببه البكتيريا. إذا لم تتم معالجته قد يسبب أضرار خطيرة لا يمكن إصلاحها

الزهري غير شائع في أستراليا، لكنه في تزايد عند بعض الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.

### هل هناك أية أعراض؟ (Are there any symptoms?)

للزهري أعراض لا تتم ملاحظتها في الأغلب.

هناك أربع مراحل لمرض الزهري: الأولية، الثانوية، الدفينة، درجة ثالثة. ولكل مرحلة مجموعة أعراض خاصة بها.

١. المرحلة الأولية للزهري (Primary Syphilis) (عشرة إلى تسعين يوماً بعد الإصابة بالمرض) في هذه المرحلة تظهر تقرحات في الفم أو الشرج أو القضيب أو المهبل أو عنق الرحم. عادةً لا تتم ملاحظة التقرحات لأنها غير مؤلمة ومحجوبة عن الرؤية (مثلاً، في المستقيم أو على عنق الرحم) وتزول بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع.

٢. المرحلة الثانوية للزهري (Secondary Syphilis) (سبعة إلى عشرة أسابيع بعد الإصابة) قد تمر أعراض المرحلة الثانوية للزهري أيضاً دون أن تتم ملاحظتها. وإذا تمت ملاحظة الأعراض فهي قد تشمل:

- طفح جلدي أحمر اللون على اليدين أو الظهر أو الصدر أو القدمين (هذا الطفح الجلدي شديد العدوى)
- حمى
- تورم في الغدد الموجودة في المنطقة بين البطن والفخذ وتحت الإبطين
- تساقط الشعر
- وهن

### ٣. المرحلة الدفينة للزهري (Latent Syphilis)

ليس لهذه المرحلة أية أعراض يمكن ملاحظتها، إلا أن الجسم يبقى مصاباً بالمرض. وإذا لم تتم معالجة الزهري عند هذه المرحلة فقد يبقى دفيناً (ساكناً) مدى الحياة أو قد يتطور ليصبح من الدرجة الثالثة.

### ٤. الزهري الثالثي (Tertiary Syphilis)

يصاب ثلث الأشخاص الذين لا يتلقون علاجاً في المرحلة الدفينة للزهري بالزهري الثالثي. في هذه المرحلة يمكن للبكتيريا أن تتلف أي عضو من أعضاء الجسم تقريباً بما في ذلك القلب والدماغ والحبل الشوكي والعيون والعظام. ويمكن أن يحصل ذلك بعد مرور سنين أو عشرات السنين بعد المرحلة الأولية. ويمكن أن يسبب الزهري الثالثي المرض العقلي والعمى والصمم ومشاكل عصبية ومرض القلب والوفاة.

يمكن للزهري أن يسبب تشوهات عند الولادة وحتى وفاة الجنين.

### كيف تنتقل العدوى؟ (How is it transmitted?)

تنتقل عدوى الزهري عادةً من خلال الاتصال الجنسي أثناء ممارسة الجنس الشرجي أو الفموي أو المهبلي. الزهري مرض شديد العدوى في المرحلتين الأولى والثانوية عند وجود التقرحات أو الطفح الجلدي. في حالات نادرة، ينتقل الزهري أثناء الحمل من الأم إلى الجنين.

**كيف يمكن الوقاية منه؟ (How is it prevented?)**

اخضع/ي لفحوصات الأمراض التي تنتقل عبر الجنس بانتظام للكشف عن أية عدوى قبل حصول مضاعفات ولمنع انتقالها للآخرين. يجب استخدام العازل المطاطي دائماً.

استخدام العازل المطاطي ومادة مخففة للاحتكاك مائية المصدر قد يخفف بشكل كبير من خطر انتقال الزهري وغير ذلك من الأمراض الجنسية المعدية.

لا تمارس/ي الجنس مع شخص تم تشخيص الزهري أو أعراض الزهري لديه، حتى مع استخدام العازل المطاطي، إلا بعد بعد إكمالهم العلاج.

**كيف يتم تشخيصه؟ (How is it diagnosed?)**

يتوجب إجراء فحص دم لتشخيص الإصابة. إذا وجدت تفرحات في المرحلة الأولية من الإصابة يمكن للطبيب أخذ مسحة (باستخدام عود قطني الطرف) وفحصها. وبغض النظر عن وجود تفرحات أو عدم وجودها، يمكن للطبيب إجراء فحص دم للتحقق من وجود أجسام مضادة للزهري. يستغرق تكوّن الأجسام المضادة للزهري في الدم بين ثلاثة وستة أشهر، لذا فقط تكون نتيجة الفحوصات الأولى سلبية. وبما أن فحص الدم الأولي يكشف الأجسام المضادة التي يفرزها الجسم لمقاومة الإلتهاب، فإن النتيجة الإيجابية تعني بأنك إما تعاني من إصابة حالية أو أنك قد أصبت في السابق. ومن الضروري إجراء فحوصات أخرى لتحديد ما إذا كانت الإصابة لا زالت نشطة. فمن الممكن تكرار الإصابة حتى بعد إكمال العلاج.

يتم فحص الحوامل للكشف عن الإصابة بالزهري دائماً لمنع انتقال العدوى إلى الجنين.

**كيف يتم علاجه؟ (How is it treated?)**

يتم علاج الزهري بسهولة بواسطة حقن أو حبوب البنسلين، وتعتمد مدة العلاج على مرحلة المرض. وقد تحتاج للخضوع لفحوصات دم لاحقة للتحقق من نجاح علاجك.

**إخبار الشريك (Telling partners)**

إذا كنت مصاباً/ة بالزهري عليك الامتناع عن ممارسة الجنس إلى أن يخبرك طبيبك أن علاجك قد تم بنجاح. من الضروري إخبار شريكك/شريكتك الجنسي/ة لكي يخضع للفحص والعلاج. يمكن للطبيب مساعدتك في تحديد الأشخاص الذين قد يكونون في خطر والاتصال بهم.

الزهري مرض يجب التبليغ عنه. ويعني ذلك أن الطبيب وموظفي المختبر ملزمون قانونياً بإخبار دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز حول الحالات الجديدة. هذه المعلومات سرية وخصوصية وتستخدم لمصلحة الصحة العامة.

المعلومات المذكورة في هذه النشرة هي معلومات عامة و عليك مراجعة الطبيب إذا كنت قلقاً بشأن صحتك.

**للاتصال (Contact)**

الرقم المجاني لخط المعلومات التابع للصحة الجنسية في نيو ساوث ويلز 1800 451 624.